



Un comprimido de 100 mg de ^{13}C-urea
Cuatro tubos de vidrio: dos BASAL y dos POST
Dos tubos flexibles
Un prospecto

VENTAJAS PARA EL PACIENTE:

NO INVASIVO
SEGURO Utiliza un Isótopo Estable

VENTAJAS PARA EL MÉDICO

SIMPLE
CONFIABLE
APROBADO en adultos y niños mayores a 5 años
APTO para embarazadas
Determina el estado de colonización de la bacteria

LABORATORIOS BACON S.A.I.C.

Tel +54(11) 4709-0171 | Fax +54(11) 4709-2636
www.bacon.com.ar | ventas@bacon.com.ar

isomed PHARMA

10-A-013/07/0912

Su aliento,
el mejor diagnóstico

TauKit

El método más **SIMPLE**
para detectar el ***Helicobacter pylori***

taukit

EL MÉTODO MÁS
SIMPLE
PARA DETECTAR EL
HELICOBACTER PYLORI

HELICOBACTER PYLORI

El ***Helicobacter pylori*** actúa en el estómago aumentando la secreción de ácidos en algunos pacientes y debilitando la mucosa gástrica sobre la que se asienta.

Las complicaciones derivadas de la infección por esta bacteria son muy diversas: gastritis crónicas inespecíficas, úlceras duodenales y úlceras gástricas. Además la infección es prevalente en pacientes con carcinoma y linfoma tipo MALT.

DIAGNÓSTICO CON TAUKIT®

FUNDAMENTO DE TAUKIT®

TAUKIT® está basado en la fuerte actividad ureasa de ***H. pylori***. Así, cuando la ^{13} C-Urea llega al estómago, la ureasa de ***H. pylori*** la hidroliza en amonio y dióxido de carbono marcado ($^{13}CO_2$). Este dióxido de carbono marcado será absorbido por el organismo, difundido a los pulmones y finalmente espirado.

CUADRO COMPARTIDO DE SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD

	Sensibilidad (%)	Especificidad (%)
SEROLOGÍA	85-95	80-95
TEST DE HECES		
Pre-tratamiento	91	93
Post-tratamiento[7]	93	92
TAUKIT®		
Pre-tratamiento	96	100
Post-tratamiento	100	97

La prueba del test del aliento con ^{13}C Urea es de fácil realización tanto en niños como en adultos, es inocua por lo que puede ser realizada a mujeres embarazadas y madres que estén amamantado. Posee un elevado porcentaje de exactitud diagnóstica y resulta muy útil para el seguimiento de pacientes como sistema de control de evolución de la infección luego del tratamiento medicamentoso.
TAUKIT en niños: Este medicamento podrá ser administrado a niños a partir de los 5 años de edad. La dosis será de 50 mg de ^{13}C Urea equivalente a medio comprimido el cual se deberá disolver en medio vaso de agua.

MÉTODO GOLD STANDARD

El test de aliento con ^{13}C-Urea es el método GOLD DTANDARD para monitorear el tratamiento erradicador de ***Helicobacter pylori***.



* Dispepsia o úlcera duodenal no complicada cuyos síntomas responden al tratamiento. Para otros diagnósticos puede ser necesario realizar una endoscopía

Protocolo de TAUKIT®


1 Administrar al paciente una solución de ácido cítrico.


2 Esperar 10 minutos


3 Recoger las muestras pre-dosis (BASAL)


4 ADULTOS: Administrar un comprimido de TAUKIT® disuelto en 125 ml de agua
NIÑOS: Administrar medio comprimido de TAUKIT® disuelto en 50 ml de agua.


5 Esperar 30 minutos


6 Recoger las muestras post-dosis (POST)


7 Identificación de muestras y envío para análisis